

RO

ANEXĂ

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

Ratikett rodenticid pasta

Tip(uri) de produs

TP 14: Rodenticide

Numărul autorizației: RO/2022/0332/MRS/HU-2013-PA-14-00045-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: RO-0029401-0000

Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

| | |
|--------------------------------|---|
| Denumire (denumiri) comerciale | Ratikett rágcsálóirtó pép / Ratikett paste bait |
|--------------------------------|---|

1.2. Deținătorul autorizației

| | | |
|--|----------|---|
| Denumirea #i adresa de#inătorului autoriza#iei | Denumire | Metatox Kft. |
| | Adresă | Kossuth utca 8. 5520 Szeghalom Ungaria |
| Numărul autoriza#iei | | RO/2022/0332/MRS/HU-2013-PA-14-00045-0000 |
| Numărul deciziei de reglementare R4BP | | RO-0029401-0000 |
| Data autoriza#iei | | 24/06/2014 |
| Data de expirare a autoriza#iei | | 31/12/2026 |

1.3. Producătorul (producătorii) produsului

| | |
|-------------------------------|---|
| Denumirea producătorului | Metatox Peszticid Gyártó-, és Forgalmazó Kft, |
| Adresa producătorului | Kossuth u. 8. 5520 Szeghalom Ungaria |
| Adresa locurilor de produc#ie | Metatox Peszticid Gyártó-, és Forgalmazó Kft, site 1 Kossuth u. 8. 5520 Szeghalom Ungaria |

1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

| | |
|-------------------------------|--|
| Substan#ă activă | Bromodiolonă |
| Denumirea producătorului | PelGar International Ltd. |
| Adresa producătorului | Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit al Marii Britanii #i Irlandei de Nord |
| Adresa locurilor de produc#ie | PelGar International Ltd. site 1 Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit al Marii Britanii #i Irlandei de Nord |

Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

| Denumire comună | Denumire IUPAC | Funcție | Număr CAS | Număr CE | Conținut (%) |
|-----------------|---|------------------|------------|-----------|-----------------------|
| Bromodiolonă | 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one | Substanță activă | 28772-56-7 | 249-205-9 | 0,005 % (de greutate) |

2.2. Tip(uri) de formulare

RB Momeală (gata de utilizare)

Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

| | |
|--------------------|---|
| Fraze de pericol | H360D: Poate dăuna fătului. H372: Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată sânger. |
| Fraze de precauție | P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. P401: A se depozita în conformitate cu Departamentul de mâncare, băutură și hrană pentru animale. P501: Aruncați conținutul la conform reglementărilor locale. P501: Aruncați recipientul la conform reglementărilor locale. |

Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1. Descrierea utilizării

Tabel 1.

Tabelul 1. Utilizarea nr. 1 – Șoareci de casă – specialiști – la interior

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Inaplicabil pentru rodenticide |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: adults and juveniles |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior La interior |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 20-30 g / stație de momeală - Numărul și calendarul de aplicare: 20-30 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 3 metri. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 10 g plicuri individuale în cupă de plastic - 3 kg și 5 kg 10 g plicuri individuale în cutie de carton - 3 kg și 5 kg 10 g plicuri individuale în pungă de plastic- 20 kg, 25 kg și 50 kg |

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează cel puțin o dată la 2-3 zile la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

Respecta#i instruc#iunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

4.1.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

-

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasa#i capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigura#i-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

-

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

-

4.2. Descrierea utilizării

Tabel 2.

Tabelul 2. Utilizarea nr. 2 – Șobolani – specialiști – la interior

| | |
|---|--|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Inaplicabil pentru rodenticide |
| Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: adults and juveniles |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior |

| | |
|--|---|
| | La interior |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 50-100 g/stație de momeală - Numărul și calendarul de aplicare: 50-100 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 10 g plicuri individuale în cupă de plastic - 3 kg și 5 kg 10 g plicuri individuale în cutie de carton - 3 kg și 5 kg 10 g plicuri individuale în pungă de plastic- 20 kg, 25 kg și 50 kg |

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar. Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

-

4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

-

4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

-

4.3. Descrierea utilizării

Tabel 3.

Tabelul 3. Utilizarea nr. 3 – Șoareci de casă și/sau șobolani – specialiști – la exterior, în jurul clădirilor

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Inaplicabil pentru rodenticide |
| Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: adults and juveniles Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: adults and juveniles |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în exterior La exterior, în jurul clădirilor |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Controlul șoarecilor: 20-30 g / per momeală; Controlul șobolanului: 50-100 g / per stație de momeală - Numărul și calendarul de aplicare: Pentru controlul șoarecilor: 20-30 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 3 metri. |

| | |
|--|---|
| | <p>Pentru controlul #obolanilor:</p> <p>50-100 g de momeală pe sta#ia de momeală. Dacă este nevoie de mai multe sta#ii de momeală, distan#a minimă între sta#iile de momeală ar trebui să fie de 5 metri.</p> |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesionist |
| Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare | <p>10 g plicuri individuale în cupă de plastic - 3 kg #i 5 kg</p> <p>10 g plicuri individuale în cutie de carton - 3 kg #i 5 kg</p> |

4.3.1. Instruc#iuni specifice de utilizare

Proteja#i momeala de intemperii (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Amplasa#i capcanele în zone fără risc de inundare.

Capcanele se inspectează [în cazul #oarecilor – cel pu#in o dată la 2-3 zile la] [în cazul #obolanilor – numai după 5-7 zile de la] începerea tratamentului #i cel pu#in săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată #i dacă se men#ine integritatea capcanelor, precum #i pentru a îndepărta rozătoarele moarte.

Realimenta#i cu momeală atunci când este necesar.

Înlocui#i momelile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

Respecta#i instruc#iunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

4.3.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu aplica#i acest produs direct în grape.

4.3.3. În func#ie de modul de utilizare, particularită#i ale efectelor posibile directe sau indirecte, instruc#iuni de prim-ajutor #i măsuri de urgen#ă pentru protec#ia mediului

Atunci când a#eza#i puncte de momeală aproape de apele de suprafa#ă (de exemplu râuri, băl#i, canale de apă, diguri, #an#uri de irigare) sau sisteme de scurgere a apei, asigura#i-vă că se evita contactul cu momeală cu apa.

4.3.4. În func#ie de modul de utilizare, instruc#iuni pentru eliminarea în siguran#ă a produsului #i a ambalajului acestuia

-

4.3.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

4.4. Descrierea utilizării

Tabel 4.

Tabelul 1. Utilizarea nr. 1 – Șoareci de casă și/sau șobolani – experți – la interior

| | |
|---|--|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Inaplicabil pentru rodenticide |
| Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: adults and juveniles Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: adults and juveniles |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în interior La interior |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării |
| Rata (ratele) și frecven#a de aplicare | Frecven#a de aplicare: Controlul șoarecilor: 20-30 g / per momeală; Controlul șobolanului: 50-100 g / per sta#ie de momeală - Numărul și calendarul de aplicare: Pentru controlul șoarecilor: 20-30 g de momeală pe sta#ie de momeală. Dacă este nevoie de mai multe sta#ii de momeală, distan#a minimă între sta#iile de momeală ar trebui să fie de 3 metri. Pentru controlul șobolanilor: |

| | |
|--|---|
| | 50-100 g de momeală pe stația de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 5 metri. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesioniști instruiți |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | 10 g plicuri individuale în cupă de plastic - 3 kg și 5 kg 10 g plicuri individuale în cutie de carton - 3 kg și 5 kg 10 g plicuri individuale în pungă de plastic- 20 kg, 25 kg și 50 kg |

4.4.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Îndepărtați resturile de produs la sfârșitul perioadei de tratament.

Respectați instrucțiunile suplimentare prevăzute de codul de bune practici relevant.

4.4.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și ai împrejurimilor acesteia) în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul].

Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.

- Pentru a reduce riscul de intoxicație secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului, conform recomandărilor conținute în codul de bune practici relevant.

Nu folosiți produsul în tratamente de momeli pulsate.

În caz de acțiune permanentă:

Acordarea permanentă este strict limitată la site-urile cu un potențial ridicat de reinvadare atunci când alte metode de control s-au dovedit insuficiente.-

Strategia permanentă de acțiune este revizuită periodic în contextul combaterii integrate a dăunătorilor și a evaluării riscului de re-infestare.

4.4.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

-

4.4.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

-

4.5. Descrierea utilizării

Tabel 5.

Tabelul 2. Utilizarea nr. 2 – Șoareci și/sau șobolani – experți – la exterior și în jurul clădirilor

| | |
|---|---|
| Tip de produs | TP 14: Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Inaplicabil pentru rodenticide |
| Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: adults and juveniles Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: adults and juveniles |
| Domeniul (domeniile) de utilizare | utilizare în exterior La exterior, în jurul clădirilor |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării |
| Rata (ratele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: Controlul șoarecilor: 20-30 g / per momeală; Controlul șobolanului: 50-100 g / per stație de momeală - Numărul și calendarul de aplicare: Pentru controlul șoarecilor: |

| | |
|--|---|
| | <p>20-30 g de momeală pe stație de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 3 metri.</p> <p>Pentru controlul șobolanilor:</p> <p>50-100 g de momeală pe stația de momeală. Dacă este nevoie de mai multe stații de momeală, distanța minimă între stațiile de momeală ar trebui să fie de 5 metri.</p> |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesioniști instruiți |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | <p>10 g plicuri individuale în cupă de plastic - 3 kg și 5 kg</p> <p>10 g plicuri individuale în cutie de carton - 3 kg și 5 kg</p> |

4.5.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.

Pentru acțiune permanentă:

Atunci când este posibil, se recomandă ca zona tratată să fie revizuită cel târziu la 4 săptămâni pentru a evita orice selecție a unei populații rezistente.

Urmați orice instrucțiuni suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant. Pentru aplicarea în punctele de byte acoperite și protejate: - Pentru utilizare în exterior, punctele de byte trebuie acoperite și plasate în site-uri strategice pentru a reduce expunerea la speciile care nu vizează.

Urmați orice instrucțiuni suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

4.5.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați eventualii participanți (de exemplu, utilizatorii zonei tratate și împrejurimile lor) despre campania de combatere a rozătoarelor

Luați în considerare măsurile de control preventiv (de ex. Găuri de priză, îndepărtați potențialele alimente și băuturi, pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de produse și pentru a reduce probabilitatea de a fi invadată.

Pentru a reduce riscul de intoxicații secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în conformitate cu recomandările furnizate de codul de bune practici relevant. Produsele pot fi utilizate numai în tratamente permanente la acele site-uri cu potențial ridicat de reinvasiune atunci când alte metode de control s-au dovedit insuficiente. Nu folosiți produsul în tratamente de momeli pulsate.

În caz de acțiune permanentă:

Atingerea permanentă este strict limitată la site-urile cu un potențial ridicat de reinvasiune atunci când alte metode de control s-au dovedit insuficiente.

Strategia permanentă de acțiune este revizuită periodic în contextul combaterii integrate a dăunătorilor și a evaluării riscului de re-infestare.

4.5.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.5.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

-

4.5.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

-

Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE¹

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.

- Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării.

Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (de exemplu, boabe de cereale vărsate sau resturi de mâncare).

Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.

- Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor, care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și, atunci când este posibil, metode fizice de combatere.

Produsul trebuie să fie amplasat în imediata apropiere a locurilor în care s-a observat prezența rozătoarelor (de exemplu, căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).

- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau de alte structuri.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind conținutul de rodenticide și interzicerea mutării sau a deschiderii acestora (a se vedea punctul 5.3 privind informațiile care se înscriu pe etichetă).

Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată durata tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismente privind riscul de intoxicație primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor care se iau în caz de intoxicație.

- Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.

- Amplasați produsul în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale de companie, animale de fermă și alte animale nevizitate.

- Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele aflate în contact cu acestea.

[Atunci când este cazul, conform evaluării riscurilor:

¹Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

Manipulați produsul numai cu mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice (materialul mănușilor este specificat de titularul autorizației în informațiile privind produsul).

Dacă este relevant, specificați orice alt EIP (de exemplu, ochelari de protecție sau mască) obligatoriu la manipularea produsului.]

Nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați în timpul utilizării produsului. După utilizarea produsului, spălați-vă mâinile și pielea direct expusă.

Frecvența vizitelor în zona tratată rămâne la discreția operatorului, în funcție de rezultatele studiului efectuat la începutul perioadei de tratament.

Această frecvență trebuie să fie conformă cu recomandările cuprinse în codul de bune practici relevant.

- Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în alte locuri și o eventuală schimbare a formulei momelii.

Dacă momeala continuă să fie consumată după o perioadă de tratament de 35 de zile și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situații.

Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic.

Luați în considerare și utilizarea de curse, ca măsură de combatere alternativă.

Instrucțiuni de utilizare specifice diferitelor tipuri de momeli:

Momeală ambalată în plicuri: [Pentru plicurile care nu se golesc - Nu deschideți plicul cu momeală].

Pastă:

a) Aplicați pasta cu un instrument de lungime suficientă (spatulă), pentru a reduce riscul de expunere a mâinii – evitați să introduceți mâna în găleată.

b) Specificați modul de spălare a instrumentelor (de exemplu, a spatulei) și modul în care se poate evita contactul cu resturile de momeală.

Pelete neagregate – granule sau boabe: Amplasați momeala în capcană folosind un recipient de dozare. Specificați metodele de reducere la minimum a prafului (de exemplu, #tergere umedă).

Formule de contact (de exemplu, spumă, geluri): După finalizarea măsurii de combatere a dăunătorilor, colectați produsul rezidual de la locul utilizării, folosind prosoape uscate.

Momeală lichidă:

Fixați capcana pe sol.

În caz de vărsare accidentală a lichidului, eliminați capcana ca pe un deșeu periculos.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor în legătură cu campania de combatere a rozătoarelor [conform codului de bune practici aplicabil, dacă este cazul].

- Informațiile despre produs (eticheta și/sau prospectul) trebuie să specifice în mod clar că produsul se furnizează exclusiv utilizatorilor experți, posesori ai unor certificări care să ateste îndeplinirea cerințelor de formare aplicabile (de exemplu, „numai pentru experți”).

- A nu se utiliza în zone în care poate fi suspectată o rezistență la substanța activă.

Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficacității tratamentului.

Nu utilizați prin rotație anticoagulanți diferiți, cu potență comparabilă sau mai mică, în scopul gestionării rezistenței.

Pentru utilizarea prin rotație, analizați posibilitatea folosirii unui rodenticid fără efect coagulant, dacă este disponibil, sau a unui anticoagulant cu potență mai mare.

- Între aplicări, nu spălați cu apă capcanele sau ustensilele folosite în capcane acoperite și protejate.

Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acest produs conține o substanță anticoagulantă.

Simptomele în caz de ingestie, care uneori se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale.

În cazuri severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau în urină.

- Antidot: vitamina K1, administrată numai de personal medical/veterinar.

- În caz de:

- expunere cutanată, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.

- expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.

- expunere orală, clătiți atent gura cu apă.

Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente.

Nu provocați vomă.

În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului.

Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de un animal de companie.

Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „a nu se muta sau deschide”; „conține un produs rodenticid”; „denumirea produsului sau numărul de autorizație”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică”.

- Periculos pentru animalele sălbatice. "

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Depozitați într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis și departe de lumina directă a soarelui.

Depozitați în locuri împiedicate de accesul copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de la fermă.

Perioada de valabilitate: 24 de luni

Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelii.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli.

Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați.

- Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.